



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ด้านกักสัตว์ชุมพร อำเภอกาบัง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๔๐ โทร., โทรสาร ๐ ๗๗๖๑ ๓๐๑๑

ที่ กษ ๐๖๒๑(ชพ)/๑๓๗

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา
รอบที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน

ตามหนังสือกองสารวัตรและกักกัน ที่ กษ ๐๖๐๒/ว ๑๑๙๘ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
แจ้งให้ด้านกักสัตว์ชุมพร จัดทำแผนการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชารายบุคคล รอบที่ ๒/๒๕๖๕ โดยพัฒนา
บุคลากรที่เป็นข้าราชการร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการทั้งหมด และพนักงานราชการร้อยละ ๑๐๐ ของ
พนักงานราชการทั้งหมด ส่งให้กองสารวัตรและกักกันในรูปแบบไฟล์ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
aqic@dld.go.th ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดทราบแล้วนั้น

ด้านกักสัตว์ชุมพร จึงขอส่งแผนการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา รอบที่ ๒/๒๕๖๕ ตามเอกสารที่
แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพรชัย อินทร์คำดี)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชุมพร

การอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่

เรื่อง

การตรวจคัดกรองโรคลัมปี สกิน ในโคกระบือ

ด่านกักกันสัตว์ตาก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

บรรยายภาคการอบรม



ตัวอย่างประกาศนียบัตร



ด่านกักกันสัตว์ตาก กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์

ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายมานพ ใจโพธิ์

ได้ผ่านการอบรมเรื่อง

“การตรวจคัดกรองโรคโรคล้มปี่ สกิน (Lumpy skin disease) ในโค กระบือ”

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(นายวิชาญ นวลแก้ว)

หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตาก



ด่านกักกันสัตว์ตาก กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์

ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายเอกดนัย สารสุวรรณ

ได้ผ่านการอบรมเรื่อง

“การตรวจคัดกรองโรคโรคล้มปี่ สกิน (Lumpy skin disease) ในโค กระบือ”

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(นายวิชาญ นวลแก้ว)

หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตาก

ตัวอย่างประกาศนียบัตรเรียนออนไลน์



สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้เพื่อแสดงว่า

นางณัฐริมาส เกียรติมาลา

ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วิชา วัยเก่า จลาตรูเน็ต

[รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง]
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

[นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์]
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน



การตรวจคัดกรอง โรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ

ด่านกักกันสัตว์ตาก
กองสารวัตรและกักกัน
กรมปศุสัตว์



LUMPY SKIN DISEASE

Lumpy skin disease

โรคลัมปี สกิน

เป็น เชื้อ Virus

Lumpy Skin Disease virus

ระยะฟักตัว 4-14 วัน

ติดต่อใน โค กระบือ
ไม่ติดต่อสู่คน

เป็นโรคระบาดสัตว์ตาม
พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2558

พบการระบาดของโรค
จากประเทศเพื่อนบ้าน



อัตราการป่วย 5-40%

อัตราการตาย 10 %
ในลูกสัตว์

● พาหะนำโรค

โรคลัมปี สกิน มีแมลงดูดเลือด เช่น เติบ แมลงวันดูดเลือด และยังเป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรง ผ่านทางน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ที่เป็นโรค หรือผ่านทางรกได้



อาการ โรคลมปี สกิน

1

ไข้สูง ถึง 41 องศา

2

เกิดตุ่มที่ผิวหนัง ทั่วตัว

3

ต่อมน้ำเหลืองโต

4

พบน้ำนมสดในโคนม

ลักษณะรอยโรค Lumpy skin disease





การประเมินระยะเวลาการได้รับเชื้อเบื้องต้น สำหรับประกอบการสอบย้อนกลับเพื่อ
ค้นหาแหล่งที่มาของโรค



ประมาณ 7 วันภายหลังการติดเชื้อ พบว่าผิวหนังเริ่มมีตุ่ม
(Nodule) ขึ้นแต่รอยโรคค่อนข้างตื้นและแยกจากสาเหตุอื่นๆ ได้ยาก



ประมาณ 11 วันภายหลังการติดเชื้อ พบว่าเริ่มมีตุ่มนูนเพิ่มจำนวน
และขยายขนาด เพิ่มมากขึ้น แต่ผิวหนังด้านบนยังไม่มีการหลุดออก





ประมาณ 14 วันภายหลังการ
ติดเชื้อ พบว่าขอบเขตรอยโรค
ชัดเจน เริ่มมีสะเก็ด ก่อตัวขึ้นบน
รอยโรค ในช่วงนี้รอยโรคอาจ ยัง
เห็นไม่ชัดเจนถ้าไม่โกนขนออก



ประมาณ 19 วัน ภายหลังการ
ติดเชื้อ พบว่าสะเก็ดก่อตัวขึ้น บน
รอยโรคอย่างชัดเจน



ประมาณ 21-26 วันภายหลังการติดเชื้อ พบว่าสะเก็ดเริ่มมีการลอกหลุด
เกิดเป็นแผลหลุมตามมา



ประมาณ 27 วันขึ้นไปภายหลังการติดเชื้อ พบว่าแผลหลุมที่เกิดขึ้นเริ่มแห้ง และบางส่วนอาจ เกิดเป็นแผลเป็น ซึ่งเมื่อพบว่าสัตว์มีแผลเป็นแล้วอาจจะ ประเมินการณได้ว่าสัตว์ได้รับการติดเชื้อมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 เดือน



การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

- ตุ่มที่บริเวณผิวหนัง สะเก็ดแผล มีปริมาณเชื้อไวรัส LSDV ในปริมาณที่ค่อนข้างมาก สามารถพบเชื้อไวรัสจากส่วนนี้ได้ถึง 38 วัน
- สามารถพบเชื้อไวรัสได้ในเลือด น้ำลาย สิ่งคัดหลั่งจากตาและจมูก และน้ำเชื้อ
- สำหรับเชื้อไวรัสในน้ำมูกและน้ำลายนั้น พบว่ามีปริมาณค่อนข้างน้อย สามารถก่อโรคได้แบบไม่รุนแรง

- เชื้อไวรัสในเลือดจะพบได้ประมาณ 7-21 วันหลังติดเชื้อ แต่จะพบเชื้อไวรัสได้ในปริมาณที่น้อยกว่าจากตุ่มที่เกิดขึ้นบริเวณผิวหนัง
- พ่อพันธุ์สามารถขับเชื้อไวรัสผ่านทางน้ำเชื้อได้เป็นระยะเวลานาน สัตว์สามารถขับไวรัสในน้ำเชื้อประมาณ 42 วันหลังจากติดเชื้อ ได้
- พบการติดต่อผ่านทางรก โดยหากพบการติดเชื้อในแม่ช่วงปลายของการตั้งครรภ์ (ประมาณ 7 เดือน) จะทำให้ลูกสัตว์ที่เกิดมามีรอยโรคล้มปี สกินตามวัยต่างๆ และมีความอ่อนแอ จนอาจตายในที่สุด
- สัตว์ที่หายจากโรคแล้วไม่พบว่าเป็น Carrier ได้ แต่สัตว์ที่ไม่แสดงอาการ (ประมาณ 50% ของสัตว์ที่ติด เชื้อ) ยังสามารถแพร่เชื้อได้เช่นเดียวกับสัตว์ที่แสดงอาการป่วย

ความคงทนของไวรัสในตัวอย่างชนิดต่าง ๆ

ตัวอย่างที่สามารถแยกเชื้อไวรัสได้	ระยะเวลาที่เชื้อมีชีวิตอยู่ได้
ตุ่มที่ผิวหนัง	39 วัน (อุณหภูมิห้อง)
สะเก็ดแผลแห้ง	33 วัน (อุณหภูมิห้อง) และหลายปีหากเก็บที่อุณหภูมิ -20 °C
หนังสัตว์ที่ปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติ	18 วัน (อุณหภูมิห้อง)
เลือด	5 – 16 วัน (อุณหภูมิห้อง)
น้ำลายและน้ำมูก	อย่างน้อย 21 วัน (อุณหภูมิห้อง)
สิ่งคัดหลั่งจากตา	ไม่ทราบ
น้ำเชื้อ	22 วัน (อุณหภูมิห้อง)
น้ำนม	ไม่ทราบ
ปัสสาวะและอุจจาระ	ไม่ทราบ
พื้นที่ในที่ร่มแสงแดดส่องไม่ถึง เช่น คอกสัตว์ เป็นต้น	หลายเดือน

การฆ่าเชื้อไวรัส

ประเภท	รายละเอียด
ความร้อน	55°C เวลา 2 ชั่วโมง หรือ 65°C เวลา 30 นาที
pH	น้อยกว่า 6.6 หรือมากกว่า 8.6 ขึ้นไป
สารเคมี/น้ำยาฆ่าเชื้อโรค	ether (20%), chloroform, formalin (1%), phenol (2% เวลา 15 นาที), sodium hypochlorite (2–3%), iodine compounds (1:33 dilution), Virkon® (2%), quaternary ammonium compounds (0.5%) และสารชะล้างที่สามารถละลายไขมันได้ เช่น sodium dodecyl sulphate เป็นต้น
แสงแดด	สามารถฆ่าเชื้อได้ดีแต่ไม่ทราบระยะเวลาที่แน่นอน

การวินิจฉัยแยกที่สำคัญ

การวินิจฉัยแยกแยะ	ตัวอย่างโรค	ลักษณะโรคที่สังเกตได้
Pseudo lumpy skin disease/Bovine herpes mammillitis (bovine herpes virus 2)		พบรอยโรคขึ้น ระยะเวลาเกิดโรคสั้นและรุนแรงน้อยกว่า
แมลงสัตว์กัดต่อย, ลมพิษ, และปฏิกิริยาแพ้แสง:		พบรอยโรคขึ้น ระยะเวลาเกิดโรคสั้นและรุนแรงน้อยกว่า และอาจพบรอยโรคได้ทั่วร่างกาย
Pseudocowpox (Parapoxvirus)		พบรอยโรคเฉพาะบริเวณหัวนมและเต้านม

การวินิจฉัยแยกแยะ	ตัวอย่างรอยโรค	ลักษณะรอยโรคที่สังเกตได้
Dermatophilosis เชื้อรา		รอยโรคตื้น ลักษณะเป็นรอยโรค กลาก/Ringworm ไม่มีการเกิด แผลหลุม
Bovine papular stomatitis (Parapoxvirus)		พบรอยโรคเฉพาะบริเวณเนื้อเยื่อ อ่อน เช่น ภายในปาก และ ระบบ ทางเดินหายใจ เป็นต้น

Demodicosis



รอยโรคมักพบตามหนอก คอ
หลัง สีข้าง มักพบขนร่วงด้วย
สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นได้จาก
การขีดผิวหนังและส่องดูภายใต้
กล้องจุลทรรศน์

Onchocerciasis



รอยโรคมักเกิดบริเวณใต้ท้องแนว
กลางลำตัว

แนวทางการเก็บตัวอย่างและวินิจฉัยโรค

ชนิดตัวอย่าง	ช่วงเวลาที่ควรเก็บตัวอย่าง	เน้นย้ำวิธีการเก็บ	จุดประสงค์/วิธีการตรวจ
รอยโรคที่ผิวหนัง	ประมาณ 7-30 วัน ภายหลังการติดเชื้อ	ประมาณ 5 กรัม แช่ Glycerin buffer ให้ท่วม และแช่เย็นที่ 2-6°C และส่งภายใน 48 ชั่วโมง	เพื่อการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ ด้วยวิธี PCR และการเพาะแยกเชื้อ (Virus Isolation)
เลือด (Whole Blood)	ประมาณ 7-30 วัน ภายหลังการติดเชื้อ (ช่วงที่มีภาวะ viremia)	เก็บโดยใช้ EDTA แช่เย็น 2-6°C และส่งภายใน 48 ชั่วโมง	เพื่อการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ ด้วยวิธี PCR
		เก็บโดยใช้ Heparin แช่เย็น 2-6°C และส่งภายใน 48 ชั่วโมง	เพื่อการเพาะแยกเชื้อ (Virus Isolation)
ซีรัม	ประมาณ 14-20 วัน ภายหลังการติดเชื้อเป็นต้นไป	-	ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ

มาตรการเฝ้าระวังโรค

ชะลอการนำเข้า โค กระบือ มีชีวิต จากประเทศเมียนมาร์

ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 -มกราคม2565



มาตรการผ่อนปรนการอนุญาตนำเข้าโคกระบือ จากประเทศเมียนมาร์

ขั้นตอนการเตรียมคอกสัตว์

- 1.คอกกักสัตว์ต้องได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์
- 2.มีการกำจัดแมลงพาหะ โดยการพ่นยาฆ่าแมลง
- 3.มีการติดตั้งมุ้งคอกกักสัตว์ รวมทั้งคอกย่อย และพ่นน้ำยาฆ่าแมลงในมุ้ง หรือ ติดตั้งไฟไล่แมลงพาหะ
- 4.ยกระดับระบบ Biosecurity โดยมีบ่อจุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อให้บุคคลและยานพาหนะ และห้ามบุคคลภายนอกเข้าออก
ภายในสถานที่กักกันสัตว์
- 5.ใช้ระบบการกักสัตว์แบบเข้า-ออกหมด (Alt-in all-out)
- 6.มีระยะพักคอกก่อนนำสัตว์เข้ากักอย่างน้อย 5 วัน และพ่นยาฆ่าเชื้อและยาฆ่าแมลง
- 7.ติดตั้งระบบ CCTV ในสถานที่กักกันสัตว์ โดยกำหนดให้มี

● การป้องกันโรคลัมปี สกินในวัว

- ✓ กำจัดแมลงพาหะนำโรค ด้วยการใช้สารเคมีกำจัดแมลงแบบฉีด แบบราดหลัง หรือแบบฉีดพ่น
- ✓ สำหรับสัตว์ทุกตัวในฝูง ปรับภูมิทัศน์โดยรอบฟาร์มให้โปร่ง โล่ง ไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงพาหะ
- ✓ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
- ✓ กำจัดมูลสัตว์ออกจากฟาร์มเป็นประจำหรือใช้ผ้าใบคลุมเพื่อป้องกันแมลงมาวางไข่
- ✓ ทาขี้ผึ้งให้แก่สัตว์เพื่อป้องกันแมลงดูดเลือด
- ✓ โรคนี้ไม่มีการรักษาจำเพาะ ทำได้เพียงรักษาตามอาการ



แนวทางการเคลื่อนย้ายสัตว์

(1) กรณีโค กระบือที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัปปี สกินมาแล้วเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน และไม่เกิน 180 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีนจนถึงวันที่ทำการเคลื่อนย้าย สามารถอนุญาตให้เคลื่อนย้ายได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากปศุสัตว์จังหวัด แต่จะต้องมีหนังสือรับรอง การฉีดวัคซีนจากปศุสัตว์อำเภอ และมีการฆ่าเชื้อยานพาหนะบรรทุกสัตว์และการควบคุมแมลงพาหะ ยานพาหนะบรรทุกสัตว์และบนตัวสัตว์ก่อนการเคลื่อนย้าย

(2) กรณีโค กระบือที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน หรือฉีดวัคซีน มาแล้วเกินกว่า 180 วัน

จังหวัด พบการเกิดโรค กำหนดให้การเคลื่อนย้ายโค กระบือ เข้าโรงฆ่าสัตว์ภายใน

จังหวัดเท่านั้น ส่วนกรณีอื่นๆ อาทิเช่น เข้าโรงฆ่าสัตว์ข้ามจังหวัด เลี้ยงทำพันธุ์ เลี้ยงขุน และส่งออกไป

ต่างประเทศ เป็นต้น ให้ขอความเห็นชอบจากปศุสัตว์จังหวัดตามแบบบันทึกข้อความขอความเห็นชอบ

เคลื่อนย้ายโค กระบือ เอกสารแนบ ก่อนออกไปอนุญาตเคลื่อนย้าย

จังหวัดที่ไม่พบการเกิดโรค กำหนดให้การเคลื่อนย้ายโค กระบือ เข้าโรงฆ่าสัตว์ภายในจังหวัดและพื้นที่เขตปศุสัตว์เดียวกัน

(3) ปศุสัตว์อำเภอตรวจสอบสัตว์ที่เข้าโรงฆ่าเพื่อตรวจหารอยโรคของโรคลัมปี สกิน และความถูกต้องของการเคลื่อนย้าย เป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเคลื่อนย้าย โดยให้ปฏิบัติตามประกาศ กรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการขออนุญาตและออกใบอนุญาตการตรวจโรคและ การทำลายเชื้อโรคในการนำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่อื่น พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด หากพบความผิดปกติให้แจ้งดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

(4) โค กระบือที่เข้าโรงฆ่าสัตว์ ต้องให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ทำการตรวจโรคก่อนการฆ่า โดยอาศัยตามมาตรา 34 แห่ง พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559

(5) การเคลื่อนย้ายสัตว์ในตลาดนัดค้าสัตว์ ให้ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 0610.03/ว 25501 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ปรับเปลี่ยนแนวทางการเคลื่อนย้ายโค กระบือ จากตลาดนัดค้าสัตว์ ตามมาตรการควบคุมโรคลัมปี สกิน แต่โค กระบือที่เคลื่อนย้ายได้จะต้องได้รับการฉีดวัคซีน โรคลัมปี สกินมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และไม่ เกิน 150 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีนจนถึงวันที่ทำการเคลื่อนย้าย

ขั้นตอนการกักสัตว์และการเก็บตัวอย่าง

1. กักโค กระบือเป็นเวลา 30 วัน
2. ตลอดระยะเวลาการกักให้ดำเนินการพ่นยาฆ่าแมลงทุก 7 วัน



ขั้นตอนการกักสัตว์และการเก็บตัวอย่าง

3. ในวันแรกที่มีโค กระบือเข้ามาที่กจนครบ (day 0)

-ติดเบอร์หู ทำบัตรประจำตัวสัตว์ (ด้านฯ)

-เก็บตัวอย่างเลือด (Whole blood)> และนำส่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ในพื้นที่ภายใน

48 ชั่วโมง (ด้านฯ)



ขั้นตอนการกักสัตว์และการเก็บตัวอย่าง

-ใช้ยาฆ่าแมลงแบบราดหลัง ในกลุ่ม Macrocytic lactone หรือกลุ่ม Synthetic Pyrethroid (ด้านข)



ขั้นตอนการกักสัตว์และการเก็บตัวอย่าง

ฉีดวัคซีน FMD(1st) และ LSD ในโค กระบือ (ต่าง ๆ)



4. ให้รายงานการกักต่อ สคบ./กสก. ทราบภายใน 7 วันหลังจากโค กระบือเข้ามากักจนครบจำนวน(ด้านฯ)

5. วันที่ 14 ของการเข้าชักโค กระบือ (day 14)

- ฉีดวัคซีน FMD (2nd) และ วัคซีน Hemorrhagic septicemia ในกระบือ**(ด้านฯ)

6. สังเกตอาการโค กระบือทุกวัน (day0-30)ในระหว่างการกัก หากพบโค กระบือแสดงอาการสงสัยโรคล้มปัสกิน (ด้านฯ,ปศอ.) ให้แยกโค กระบือตัวดังกล่าวออกจากฝูง

-เก็บตัวอย่างรอยโรคที่เป็นตุ่มเนื้อหรือสะเก็ดแผลและนำส่งศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการสัตวแพทย์ในพื้นที่ภายใน ๔๘ ชั่วโมง

7. กรณีผลทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธีการตรวจ RT-PCR เป็นบวกต่อเชื้อ LSDV ให้นำโค กระบือที่ให้ผลบวกออกจากฝูงและทำลาย ส่วนโค กระบือรวมฝูงให้กักต่อเป็นเวลา 2 incubation period คือ 56 วัน หากไม่พบโค กระบือแสดงอาการผิดปกติโค กระบือกลุ่มดังกล่าวสามารถเคลื่อนย้ายเข้าสู่ฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ในประเทศได้ (ด้านฯ)

ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายโค กระบือ

- 1.โค กระบือที่ถูกครบตามเงื่อนไข และไม่แสดงอาการป่วยรวมทั้งผลทางห้องปฏิบัติการเป็นลบต่อเชื้อ LSDV ด้วยวิธี RT-PCR ให้สามารถเคลื่อนย้ายภายในประเทศได้ (อ่าน)
2. ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายโค กระบือหลังการนำเข้า ให้ดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมโรค ลัมปี สกิน เลขที่ กษ 0610.07/13615 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
3. รายงานการตรวจปล่อยให้ สคบ./กก. ทราบภายใน 7 วันหลังการปล่อยโค ผ่าน App.Line “กักโคนำเข้าจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา” (อ่าน)

ให้รายงานการดำเนินการกักโค กระบือ ผ่าน **App.Line** รายละเอียดดังนี้

- 1.รายงานการวันเข้ากัก
- 2.การดำเนินการติดเบอร์
- 3.รายงานการตรวจสภาพวิศวโรค
- 4.การดำเนินการฉีดวัคซีน
- 5.การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ พ่นควันไล่แมลง ทุก 7 วัน
- 6.การเจาะเลือด
- 7.รายงานการตรวจปล่อย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ด้านกักกันสัตว์นครสวรรค์ โทร./โทรสาร ๐ ๕๖๒๔ ๗๐๘๒

ที่ กษ ๐๖๒๑ (นว)/ ๑๗๔

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
ผู้ได้บังคับบัญชา รอบที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน

ตามหนังสือกองสารวัตรและกักกัน ที่ กษ ๐๖๒๑/ว ๑๑๙๘ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง การรายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
ผู้ได้บังคับบัญชา รอบที่ ๒/๒๕๖๕ ให้หน่วยงานในสังกัดกองสารวัตรและกักกัน จัดทำแผนการพัฒนา
ผู้ได้บังคับบัญชารายบุคคล รอบที่ ๒/๒๕๖๕ ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบที่ ๒ นั้น

ด้านกักกันสัตว์นครสวรรค์ ขอส่งแผนการพัฒนาบุคลากร (IPD) รอบที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน
๓ รายวิชา ได้แก่

- ๑.หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (MS๐๖) จำนวน ๑ ราย ดังนี้
 ๑. นายชูเกียรติ พาณิชยศาสตร์วัฒน์ ตำแหน่ง หัวหน้าด้านกักกันสัตว์นครสวรรค์
- ๒.หลักสูตร ภาษาอังกฤษ : การเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (LS๐๑)
จำนวน ๑ ราย ดังนี้
 ๑. นางสาวสุภัค วงศ์มยุรฉัตร ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
- ๓.หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (SLo๓) จำนวน ๕ ราย ดังนี้
 - ๑.นายพงษ์พันธ์ ทองคำ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
 - ๒.นายณัฐทัตพล ชัยพิพัฒน์ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
 - ๓.นางสาวสวรส สารชาติ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
 - ๔.นายนันทกร เคหะวัฒนกันนท์ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
 - ๕.นายสมควร ปานจุฬา ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

รายละเอียดตามไฟล์ Excel ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชูเกียรติ พาณิชยศาสตร์วัฒน์)
หัวหน้าด้านกักกันสัตว์นครสวรรค์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ด้านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร-โทรสาร ๐๓๗ - ๖๒๕๒๑๙

ที่ กษ ๐๖๒๑ (ปจ) /๒๕๕

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแผนการพัฒนาศูนย์ (IDP) รอบที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน

ตามที่กองสารวัตรและกักกัน ให้นำหน่วยงานในสังกัดรายงานแผนการพัฒนาศูนย์ (IDP) รอบที่ ๒/๒๕๖๕ นั้น

ด้านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพจนารถ เนียมมงคล)
หัวหน้าด้านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ด้านกักกันสัตว์พิษณุโลก โทร./โทรสาร ๐-๕๕๓๐-๔๐๔๖

ที่ กษ ๐๖๒๑(ดพล)/๒๕๑

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานแผนและผลการพัฒนาบุคลากร (IDP) รอบที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน

ตามที่ กองสารวัตรและกักกัน มีหนังสือที่ กษ ๐๖๒๑/ว ๑๑๙๘ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การรายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา รอบที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานด้านกักกันสัตว์ นั้น

ด้านกักกันสัตว์พิษณุโลก ขอส่งแผนการพัฒนาบุคลากร (IDP) รอบที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับข้าราชการ จำนวน ๑ ราย และพนักงานราชการ จำนวน ๖ ราย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุรเดช ขำมัน)

หัวหน้าด้านกักกันสัตว์พิษณุโลก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ด้านกักกันสัตว์โยธธ ๒๐๖ หมู่ ๔ ตำบลคู่มู อำเภอเมือง จังหวัดโยธธ ๓๕๐๐๐

ที่ กษ.๐๖๒๑(ยส)/ ๑๐๑ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแผนการพัฒนามูลาการตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา

เรียน ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน

ตามหนังสือ ที่ กษ ๐๖๒๑/ ว.๑๑๔๘ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การรายงานแผนและ
ผลด้านการพัฒนามูลาการตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา รอบที่ ๒/๒๕๖๕

ด้านกักกันสัตว์โยธธ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนามูลาการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ)

หัวหน้าด้านกักกันสัตว์โยธธ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ด้านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี โทร. ๐ ๓๕๕๕ ๑๔๑๑ โทรสาร ๐ ๓๕๕๕ ๑๔๑๑
ที่ กษ ๐๖๒๑ (สพ)/ ๒๓๓ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง ขอส่งรายงานแผนด้านการพัฒนาบุคลากร (IDP) รอบที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน

ตามที่กองสารวัตรและกักกัน ให้งานหน่วยงาน ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร (IDP) รอบที่ ๒/๒๕๖๕ รายละเอียดตามหนังสือกองสารวัตรและกักกัน (ฝ่ายบริหารทั่วไป) ที่ กษ ๐๖๒๑/ว๑๑๙๘ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

ด้านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี ขอส่งแผนการพัฒนาบุคลากร (DIP) รอบที่ ๒/๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายปัญญา รัตนวรกมล)
หัวหน้าด้านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี